

ÍNDICE DE ABORTO INDUZIDO NA CIDADE DE CAMBARÁ- PR

CONTENTS OF THE CITY OF INDUZIDO ABORTION CAMBARÁ-PR

¹IFERREIRA, O. S.; ²DALOZO S, M^a.

^{1 e 2}Departamento de Ciências Biológicas - Faculdades Integradas de Ourinhos

RESUMO

O aborto induzido é a interrupção de uma gravidez, onde o feto é expulso antes do final do seu desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi constatar se houve casos de abortamento na cidade de Cambará –Pr , a faixa etária dessas mulheres , os procedimentos e materiais utilizados , saber quantas delas realmente conseguiram concluir esse aborto, e as causas que levaram essas mulheres a tomarem tal decisão. Os resultados mostram que , a faixa etária das mulheres que chegam a esses locais com sintomas de aborto induzido foram de 13 a 23 anos , onde as mesmas não tinham uma relação conjugal fixa com o parceiro, condição social para proporcionar a sustentabilidade dessa gravidez. Fizeram a utilização de medicamentos como Cytotec® além de , chás e ervas. Todas as mulheres que deram entrada nos hospitais concluíram o aborto e acabaram tendo complicações por retenção de restos placentários , perfuração do útero e até esterilidade .
Palavras-chave: aborto; abortamento, gravidez interrompida.

ABSTRACT

The induced abortion is the interruption of a pregnancy where the fetus is expelled before the end of its development. The research aimed to see if there were cases of abortion in the city of Cambará-Pr, the age group of women, procedures and materials used, how many of them actually managed to conclude that abortion, and the causes that led these women to take such a decision . The results show that the age group of women who come to these places with symptoms of induced abortion were 13 to 23 years, where they had not fixed a conjugal relationship with the partner, social condition to provide the sustainability of this pregnancy. They have made the use of drugs as Cytotec ® beyond, teas and herbs. All women who were brought in hospitals concluded abortion and ended up having complications by remnants of placental retention, perforation of the uterus and even sterility.
Keywords: abortion, abortion, pregnancy interrupted.

INTRODUÇÃO

O aborto consiste na interrupção da gravidez podendo ser espontâneo ou induzido. É espontâneo quando o embrião é expulso espontaneamente pelo útero sem nenhuma intervenção, enquanto o aborto induzido é feito intencionalmente através de uma intervenção externa. (SANTOS, 1986)

De acordo com Tiese e Henshaw (1986) *apud* Hardy *et al*; 2001. O aborto induzido expõe a mulher a vários riscos e complicações gravíssimas que variam de acordo com a maneira que é realizado, porém existem poucas informações na literatura que concretize esta relação. Essas complicações constituem um problema

sério principalmente para as mulheres de comunidades menos favorecidas que não recebem atendimento médico (LADIPO,1987 *apud* HARDY *et al*; 2001).

Devido ao grande aumento dos casos de aborto induzido e levando em conta a verificação de possíveis complicações causadas por estes métodos na maioria das vezes agressivos a mulher, torna-se de grande importância e grande urgência tomar providências sobre as ocorrências desses casos (COOK,1991 *apud* HARDY ,E ; COSTA,R. *et al*; 2001)

Muitas vezes o aborto provocado é visto apenas como um problema médico e com isso fica em um segundo plano os aspectos psicológicos e sociais (PINOTTI,1969; GALBINSKI, 1971; BOEHS 1983; *et al* ; *apud* COSTA.R. ; *et al*).

“O aborto induzido é crime no Brasil, só é legalmente permitido quando é para salvar a vida da mulher ou quando essa concepção ocorre devido a um estupro e mesmo assim mulheres cometem esse ato . A penalidade para as mulheres que se submetem ao aborto ilegal varia de um a dez anos de prisão com a pena duplicada para os que auxiliaram nesse ato”, conforme o código penal artigos 126,129,decreto lei nº2848 de 7 de Dezembro e emendas 1941-1969.

Quando a mulher comete um aborto ela é considerada a única responsável por esse ato, acabando sendo a criminosa principal . As conseqüências dessa decisão, são tratadas como uma questão da saúde da mulher e do bem estar da família (COOK,1991 *apud* HARDY ,E ; COSTA,R. *et al*; 2001).

No início da década de 70 houve ocorrências de 600 mil a 3 milhões de abortos induzidos com o uso de drogas, ervas, venenos, instrumentos perfurantes e atuações de parteiras dentre outros métodos, somente a partir da década de 80 que vieram a ser substituídos pelo uso do Misoprostal conhecido como Cytotec, que é capaz de interromper a gestação. O medicamento é na maioria das vezes adquirido, em farmácia sem prescrição médica segundo dados de COSTA *et al*,(1989).

Smigay (1993) e Ramíres Galvez (1999) *apud* Duart.G. *et al* (2002), apontam que o envolvimento masculino na questão do aborto depende do tipo da relação existente entre o casal, se a gravidez acaba acontecendo em um relacionamento ocasional ou muito recente onde a participação do homem na discussão sobre abortar ou não é determinante.

A metodologia utilizada pelas mulheres que cometeram o aborto induzido foi na maioria dos casos , o uso do Cytotec, chás ,ervas e até mesmo soda cáustica,

que acaba resultando em complicações que pode leva-lá a morte (HENSAW, 1990; *apud* MARTINS , RAMOS.*et al* 1991).

As complicações de um aborto induzido em condições precárias trazem graves conseqüências como perfuração do útero, retenção de restos placentários infecções, peritonite, tétano e septicemia ou ainda seqüelas ginecológicas estão incluídos a esterilidade, inflamação das trompas e sinéquias uterinas (BARROSO & CUNHA .1980 ; TIETZE ; HENSHAW .1986 *apud* HARDY,E. ; ALVES ,G.2001)

Tieze e Henshaw (1986), *apud* Hardy,E. ; Alves ,G.(2001) , afirmam que :
“A incidência das complicações do aborto está relacionado com a forma como ele é realizado”.

Assim, foram objetivos desse trabalho, levantar quais foram as causas e conseqüências de realizar um aborto induzido,levantando os seguintes pontos: Proporcionar as orientações sobre o que é o aborto induzido; descrevendo o que leva a mulher a cometer esse ato. Também foi objetivo deste presente trabalho observar os materiais utilizados no ato do aborto, verificando o número de abortos que são realizados e observando as complicações que afetam as mulheres por cometerem o aborto.

MATERIAL E MÉTODOS

O material humano utilizado para realizar este trabalho constará de médicos e enfermeiros dos Hospitais Municipais, Pronto Socorro e Postos de Saúde da cidade de Cambará –Pr localizada , (23° 2' 45" S; 50° 4' 26" W) , região Norte pioneiro do Paraná e Sul do Brasil , sendo microrregião de Jacarezinho - PR .

O questionamento constará dos seguintes itens: Se houve casos de abortamento na cidade; A faixa etária dessas mulheres; Materiais utilizados para elas cometerem esse aborto; A quantidade que realmente tiveram esse aborto; O motivo que levou essas mulheres a cometerem esse ato; Quais as complicações que tiveram por cometer o aborto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi revelado pelo presente trabalho, realizado nos hospitais municipais nos postos de saúde e pronto socorro da cidade de Cambará – Pr, onde foi revelado

que a faixa etária das mulheres que chegam a esses locais com sintomas de aborto induzido foram de 13 a 23 anos, onde a maioria apenas namorava ou era solteira, utilizaram na maioria das vezes para cometer esse ato chás e ervas, e uso de medicamento como Cytotec® onde todas elas conseguiram realmente concluir esse aborto. Tiveram complicações como retenção de restos placentários, perfuração do útero e até esterilidade. O motivo que levou essas mulheres a cometer esse ato variava de acordo com cada uma, como o parceiro não querer a gravidez, pela sua condição social, número de filhos ou por não ter certeza de quem era o verdadeiro pai da criança.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, concluiu-se que, o índice de aborto induzido na cidade de Cambará, ocorre devido aos fatores socioeconômicos como: não ter um parceiro fixo, condição social para proporcionar a sustentabilidade dessa gravidez e desconhecimento sobre as conseqüências. Entre as conseqüências desse ato, cita-se o problemas de tétano, septicemia, esterilidade e até a morte da paciente.

REFERÊNCIAS

COSTA ROSELY & HARDY ELLEN; OSIS M^a JOSÉ; FAÚNDES ANIBAL. A decisão de abortar : processo e sentimentos envolvidos; RIO DE JANEIRO. **CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA**. 11: 1995.

DUARTE A. GRACIANA; ALVARENGA A. THEREZA & OSIS M^a JOSE, FAÚNDES A, HARDY ELLEN Perspectiva masculina acerca do aborto provocado. **REVISTA SAÚDE PÚBLICA** JUNHO, 2002.

FONSECA WALTER ; MISAGO CHIRUZU ; CORREIA. L ; PARENTE, JOÃO. A. M ; CHAGAS, F. O. Determinantes do aborto provocado entre mulheres admitidas em hospitais em localidade da região nordeste do Brasil, **REVISTA SAÚDE PUBLICA SÃO PAULO**. 1996.

HARDY, & ALVE, G. **As complicações pós aborto provocado : fatores associados**. UNICAMP. FACULDADES DE CIÊNCIAS MÉDICAS-CAMPINAS-SP 2001.

MARTINS , RAMOS.I; HAWKER, SARAH.C. ; REGINA, SYLVIA.S. ; SCHUCH CRISTIANE . P. ; Aborto induzido em mulheres de baixa renda ,dimensão de um problema. caderno de SAÚDE PÚBLICA RIO DE JANEIRO 1991.

OSIS , M^a. J.; HARDY ELLEN; FAÚNDES A. ; RODRIGUES , T. Conhecimento,opinião e conduta de ginecologistas e obstetras brasileiros sobre o aborto induzido. **REVISTA BRASILEIRA DE GINECOLOGIA OBSTÉTRICA**. SÃO PAULO, 2004.

SANTOS, M^a. A. **BIOLOGIA EDUCACIONAL**, EDITORA ÁTICA, 1986.

Sites Consultados:

BRENDLER, A. Departamento de notícias desenvolvidos no Estado de São Paulo: **JORNALISMO DA REDE GLOBO ESTADO DE SÃO PAULO**. Disponível em: <http://www.globo.com.br/jornalhoje>